

5.

E
S
S
E
N
E
S

Fiche réalisée dans le cadre du projet LEADER GAL "Démonstration de bonnes pratiques forestières dans la Botte du Hainaut"

Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural :
l'Europe investit dans les zones rurales

04

DÉTERMINATION
HORS FEUILLES

www.cdaf.be

En hiver, hors feuilles, les critères morphologiques d'identification des feuillus se rapportent à leur écorce (couleur, épaisseur, vieillissement), leurs rameaux (ramifications, couleur, éclat, pilosité...) et les bourgeons (disposition, forme, couleur, éclat...)

| CHÊNE PÉDONCULÉ | | |
|---|--|--|
| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
| <ul style="list-style-type: none"> crevasses profondes, recoupées par des fissures transversales plaquettes trapézoïdales massives à peine lisse couleur homogène claire  | <ul style="list-style-type: none"> alternes glabres gris-brun brillants  | <ul style="list-style-type: none"> ovoïdes obtus écailles non poilues  |

| CHÊNE SESSILE | | |
|--|--|--|
| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
| <ul style="list-style-type: none"> fines lanières longitudinales plaquettes à section carrée couleur brune, assez sombre et bigarrée  | <ul style="list-style-type: none"> alternes glabres brun-gris  | <ul style="list-style-type: none"> plus pointus et plus longs un peu poilu sur le bord des écailles  |

| HÊTRE | | |
|---|--|---|
| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
| <ul style="list-style-type: none"> lisse et gris noirâtre, restant mince, lisse et grise parfois légèrement fissurée  | <ul style="list-style-type: none"> alternes lisses, glabres, brun olive  | <ul style="list-style-type: none"> fusiformes pointus longs (2 cm), bruns et brillants rigides et piquants  |

CHARME

| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • restant lisse, mince, grise • tronc cannelé • parfois un peu fissurée  | <ul style="list-style-type: none"> • alternes • jeunes rameaux sinueux, souples, grêles, un peu pubescents à l'état jeune  | <ul style="list-style-type: none"> • ovoïdes, pointus • allongés • souples  |


MERISIER

| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • brun-rouge restant lisse • stries et lanières horizontales  | <ul style="list-style-type: none"> • alternes • brun-rouge, brillants, présence de rameaux courts et de rameaux longs  | <ul style="list-style-type: none"> • brun-rouge, glabres • par 2-5 à l'extrémité des rameaux • ovales, aigus ou globuleux  |

ERABLE SYCOMORE

| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • jeune : lisse, mince et gris-jaune brillant • âgée : brun-rouge à larges plaques écailleuses  | <ul style="list-style-type: none"> • opposés • glabres, gris-brun  | <ul style="list-style-type: none"> • ovoïdes, glabres • écailles vertes bordées de brun • terminal gros  |

FRÊNE

| ECORCE | RAMEAU | BOURGEONS |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • jeune : lisse et verdâtre • âgée : gris-brun finement et densément crevassée longitudinalement  | <ul style="list-style-type: none"> • opposés • gros, plus ou moins aplatis • nombreuses cicatrices foliaires  | <ul style="list-style-type: none"> • brun-noir  |

5.

e
s
s
e
n
e
s


| AULNE GLUTINEUX | | |
|---|---|---|
| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
| <ul style="list-style-type: none"> gris foncé se démasquant en écailles rectangulaires  <p>© CDAF asbl</p> | <ul style="list-style-type: none"> alternes anguleux brun verdâtre, ponctués de lenticelles, pourpres à l'automne  <p>© CDAF asbl</p> | <ul style="list-style-type: none"> pedonculés, gros, violacés collants  <p>© CDAF asbl</p> |

| BOULEAU VERRUQUEUX | | |
|--|---|---|
| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
| <ul style="list-style-type: none"> jeune : lisse, blanche, se détachant en lanières horizontales âgée : épaisse et irrégulièrement crevassée à la base du tronc  <p>© CDAF asbl</p> | <ul style="list-style-type: none"> alternes brun-roux foncé et brillants couverts de verrues grisâtres, glabres extrémités pendantes  <p>© CDAF asbl</p> | <ul style="list-style-type: none"> coniques et trapus glabres  <p>© CDAF asbl</p> |

| BOULEAU PUBESCENT | | |
|--|---|---|
| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
| <ul style="list-style-type: none"> jeune : fine, fines fissures horizontales âgée : rarement noire et fissurée au pied  <p>© CDAF asbl</p> | <ul style="list-style-type: none"> alternes bruns et pubescents très velus à la pointe, dressés extrémités non pendantes  <p>© CDAF asbl</p> | <ul style="list-style-type: none"> pointus et petits légèrement poilus  <p>© CDAF asbl</p> |

| COUDRIER | | |
|--|---|---|
| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
| <ul style="list-style-type: none"> grisâtre  <p>© CDAF asbl</p> | <ul style="list-style-type: none"> alternes pubescents hérissés de poils glanduleux rougeâtres  <p>© CDAF asbl</p> | <ul style="list-style-type: none"> petits globuleux  <p>© CDAF asbl</p> |

NOYER COMMUN

| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • longtemps lisse • généralement assez claire  | <ul style="list-style-type: none"> • alternes • cicatrices foliaires en forme de V • moelle cloisonnée  | <ul style="list-style-type: none"> • globuleux • à écailles brunes et glabres  |

ROBINIER FAUX-ACACIA

| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • jeune : lisse et brunâtre • âgée : gris-beige crevassée en réseau  | <ul style="list-style-type: none"> • alternes • vert-rougeâtre • épineux  | <ul style="list-style-type: none"> • épines de grande taille, très piquantes, disposées en « V » • bourgeon minuscule au milieu  |

SUREAU NOIR

| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • jeune : grise, mince et verruqueuse • âgée : gris-beige, écailleuse, fendillée  | <ul style="list-style-type: none"> • opposés • jeunes rameaux à moelle blanche • lenticelles nombreuses  | <ul style="list-style-type: none"> • pointus et petits • légèrement poilus  |

SORBIER DES OISELEURS

| ECORCE | RAMEAUX | BOURGEONS |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • jeune : lisse gris clair • âgée : lisse à fissures longitudinales gris noirâtre  | <ul style="list-style-type: none"> • brun violacés • lisses et luisants  | <ul style="list-style-type: none"> • fusiformes • velus • écailles gris-brun  |