

5.

E
S
S
E
N
C
E
S

Fiche réalisée dans le cadre du projet LEADER GAL "Démonstration de bonnes pratiques forestières dans la Botte du Hainaut"

Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural :
l'Europe investit dans les zones rurales

04

DÉTERMINATION
HORS FEUILLES

En hiver, hors feuilles, les critères morphologiques d'identification des feuillus se rapportent à leur écorce (couleur, épaisseur, vieillissement), leurs rameaux (ramifications, couleur, éclat, pilosité...) et les bourgeons (disposition, forme, couleur, éclat...)

CHÊNE PÉDONCULÉ		
ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> crevasses profondes, recoupées par des fissures transversales plaquettes trapézoïdales massives à peine lisse couleur homogène claire 	<ul style="list-style-type: none"> alternes glabres gris-brun brillants 	<ul style="list-style-type: none"> ovoïdes obtus écailles non poilues 

CHÊNE SESSILE		
ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> fines lanières longitudinales plaquettes à section carrée couleur brune, assez sombre et bigarrée 	<ul style="list-style-type: none"> alternes glabres brun-gris 	<ul style="list-style-type: none"> plus pointus et plus longs un peu poilu sur le bord des écailles 

HÊTRE		
ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> lisse et gris noirâtre, restant mince, lisse et grise parfois légèrement fissurée 	<ul style="list-style-type: none"> alternes lisses, glabres, brun olive 	<ul style="list-style-type: none"> fusiformes pointus longs (2 cm), bruns et brillants rigides et piquants 

CHARME

ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> • restant lisse, mince, grise • tronc cannelé • parfois un peu fissurée 	<ul style="list-style-type: none"> • alternes • jeunes rameaux sinueux, souples, grêles, un peu pubescents à l'état jeune 	<ul style="list-style-type: none"> • ovoïdes, pointus • allongés • souples 


MERISIER

ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> • brun-rouge restant lisse • stries et lanières horizontales 	<ul style="list-style-type: none"> • alternes • brun-rouge, brillants, présence de rameaux courts et de rameaux longs 	<ul style="list-style-type: none"> • brun-rouge, glabres • par 2-5 à l'extrémité des rameaux • ovales, aigus ou globuleux 

ERABLE SYCOMORE

ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> • jeune : lisse, mince et gris-jaune brillant • âgée : brun-rouge à larges plaques écailleuses 	<ul style="list-style-type: none"> • opposés • glabres, gris-brun 	<ul style="list-style-type: none"> • ovoïdes, glabres • écailles vertes bordées de brun • terminal gros 

FRÊNE

ECORCE	RAMEAU	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> • jeune : lisse et verdâtre • âgée : gris-brun finement et densément crevassée longitudinalement 	<ul style="list-style-type: none"> • opposés • gros, plus ou moins aplatis • nombreuses cicatrices foliaires 	<ul style="list-style-type: none"> • brun-noir 


AULNE GLUTINEUX		
ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> gris foncé se démasquant en écailles rectangulaires 	<ul style="list-style-type: none"> alternes anguleux brun verdâtre, ponctués de lenticelles, pourpres à l'automne 	<ul style="list-style-type: none"> pedonculés, gros, violacés collants 

BOULEAU VERRUQUEUX		
ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> jeune : lisse, blanche, se détachant en lanières horizontales âgée : épaisse et irrégulièrement crevassée à la base du tronc 	<ul style="list-style-type: none"> alternes brun-roux foncé et brillants couverts de verrues grisâtres, glabres extrémités pendantes 	<ul style="list-style-type: none"> coniques et trapus glabres 

BOULEAU PUBESCENT		
ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> jeune : fine, fines fissures horizontales âgée : rarement noire et fissurée au pied 	<ul style="list-style-type: none"> alternes bruns et pubescents très velus à la pointe, dressés extrémités non pendantes 	<ul style="list-style-type: none"> pointus et petits légèrement poilus 

COUDRIER		
ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> grisâtre 	<ul style="list-style-type: none"> alternes pubescents hérissés de poils glanduleux rougeâtres 	<ul style="list-style-type: none"> petits globuleux 

NOYER COMMUN

ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> • longtemps lisse • généralement assez claire 	<ul style="list-style-type: none"> • alternes • cicatrices foliaires en forme de V • moelle cloisonnée 	<ul style="list-style-type: none"> • globuleux • à écailles brunes et glabres 

ROBINIER FAUX-ACACIA

ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> • jeune : lisse et brunâtre • âgée : gris-beige crevassée en réseau 	<ul style="list-style-type: none"> • alternes • vert-rougeâtre • épineux 	<ul style="list-style-type: none"> • épines de grande taille, très piquantes, disposées en « V » • bourgeon minuscule au milieu 

SUREAU NOIR

ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> • jeune : grise, mince et verruqueuse • âgée : gris-beige, écailleuse, fendillée 	<ul style="list-style-type: none"> • opposés • jeunes rameaux à moelle blanche • lenticelles nombreuses 	<ul style="list-style-type: none"> • pointus et petits • légèrement poilus 

SORBIER DES OISELEURS

ECORCE	RAMEAUX	BOURGEONS
<ul style="list-style-type: none"> • jeune : lisse gris clair • âgée : lisse à fissures longitudinales gris noirâtre 	<ul style="list-style-type: none"> • brun violacés • lisses et luisants 	<ul style="list-style-type: none"> • fusiformes • velus • écailles gris-brun 