



Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural :
l'Europe investit dans les zones rurales



Leurs tiges allongées et particulièrement flexibles utilisent les arbres ou d'autres supports verticaux afin de profiter d'un meilleur ensoleillement. Leur croissance envahissante permet aux lianes de s'imposer rapidement aux autres végétaux. Si le lierre ne pose pas de problèmes au développement de l'arbre, il en est tout autre pour la clématite blanche et le chèvrefeuille des bois qui occasionnent des dégâts, l'un par étouffement, l'autre par étranglement et déformation du bois, dépréciant la valeur de celui-ci.

1. LIERRE GRIMPANT - Hedera helix



© CDaf asbl

- pas de risque majeur pour les troncs d'arbres sains, tailles nécessaires s'il s'étend sur les branches basses (évite la casse)
- protège d'un feu courant, de la fracture par le gel, des animaux pouvant endommager l'écorce
- absorbe l'excès d'humidité
- action chimique inhibitrice sur les champignons, bactéries ou parasites
- apport essentiel à la biodiversité : garde-manger hivernal : floraison et fruits tardifs

• CARACTÉRISTIQUES :

1. liane montant jusqu'à 30 m
2. feuilles alternes, pétiolées, coriaces, luisantes, persistantes
3. feuilles de la tige à nervures palmées à 3 ou 5 lobes
4. feuilles des rameaux florifères de lumière entières, ovales
5. fleurs jaune verdâtre en ombelles terminales
6. fruits : drupes globuleuses noir bleuâtre, cerclées vers le sommet, mûrs de mars à mai

• FLORAISON : septembre à octobre

- **LUMIÈRE** : espèce de demi-ombre ou d'ombre ne fleurissant et ne fructifiant qu'en pleine lumière

Humidité \ Acidité	Très sec	Sec	Assez sec à moyennement sec	Frais	Assez humide	Humide en permanence	Inondé en permanence
Très acide							
Acide							
Assez acide							
Faiblement acide							
Neutre							
Calcaire							

OPTIMUM

2. CLÉMATITE VIGNE BLANCHE - *Clematis vitalba*



© CDAF asbl

- « draperies » étalées risquant d'étouffer le feuillage de l'arbre hôte ou de déformer sa tige
- dégagement systématique préconisé
- **CARACTÉRISTIQUES :**
 1. liane montant jusqu'à 20 m
 2. tige à moelle pleine
 3. jeunes rameaux sillonnés
 4. feuilles opposées, composées à 3-9 folioles ovales
 5. fleurs régulières blanches
 6. akènes prolongés d'une longue arête plumeuse persistant longtemps
- **FLORAISON :** mai à août
- **LUMIÈRE :** espèce de pleine lumière

Très sec						
Sec						
Assez sec à moyennement sec				TOLERE	OPTIMUM	
Frais						
Assez humide						
Humide en permanence						
Inondé en permanence						
Humidité	Très acide	Acide	Assez acide	Faiblement acide	Neutre	Calcaire
Acidité						

3. CHÈVREFEUILLE DES BOIS - *Lonicera periclymenum*



© CDAF asbl

- s'enroule facilement autour des tiges (jeunes ou non)
- cause la déformation irrémédiable des tiges
- coupe à la base indispensable
- **CARACTÉRISTIQUES :**
 1. liane montant jusqu'à 2-4 m
 2. feuilles opposées, elliptiques, sessiles ou à court pétiole, molles, entières ou parfois légèrement dentées, lobées
 3. fleurs groupées en bouquet terminal pédonculé, odorantes, en long tube étroit
 4. baies ovoïdes, rouges, petites
- **FLORAISON :** mai à août
- **LUMIÈRE :** espèce de pleine lumière

Très sec						
Sec				TOLERE		
Assez sec à moyennement sec						
Frais		OPTIMUM				
Assez humide						
Humide en permanence						
Inondé en permanence						
Humidité	Très acide	Acide	Assez acide	Faiblement acide	Neutre	Calcaire
Acidité						