

5.

e  
s  
s  
e  
n  
e  
s

Fiche réalisée dans le cadre du projet LEADER GAL "Démonstration de bonnes pratiques forestières dans la Botte du Hainaut"







Fonds Européen Agricole  
pour le Développement Rural :  
l'Europe investit dans les zones rurales

01









CLÉ DES  
FEUILLES  
COMPOSÉES

www.cdaf.be

## → 1 DISPOSITION OPPOSÉE

Feuille	Autre(s) critère(s) d'identification
<p><b>Frêne commun</b> <i>Fraxinus excelsior</i></p>  <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 à 15 folioles lancéolées</li> <li>• limbe finement denté</li> </ul>	 <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bourgeons noirs opposés</li> </ul>
<p><b>Sureau noir</b> <i>Sambucus nigra</i></p>  <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 à 7 folioles ovales et pointues</li> <li>• limbe denté</li> <li>• pétiole des folioles court</li> <li>• présence de poils sur les nervures à la face inférieure des feuilles</li> </ul>	 <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moelle du rameau blanche (non cloisonnée transversalement)</li> </ul>
<p><b>Sureau à grappes</b> <i>Sambucus racemos</i></p>  <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 à 7 folioles ovales et pointues</li> <li>• limbe denté</li> <li>• folioles sessiles</li> <li>• pas de poils sur les nervures à la face inférieure des feuilles</li> </ul>	 <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moelle du rameau brune ou orangée (non cloisonnée transversalement)</li> </ul>

## → 2 DISPOSITION ALTERNE

Feuille	Autre(s) critère(s) d'identification
<p><b>Noyer commun</b> <i>Juglans regia</i></p>  <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 à 9 folioles ovales</li> <li>• limbe entier</li> <li>• foliole terminale plus longue</li> </ul>	 <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moelle cloisonnée transversalement</li> </ul>
<p><b>Noyer noir</b> <i>Juglans nigra</i></p>  <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 à 23 folioles lancéolées</li> <li>• limbe denté, velu au-dessous</li> <li>• très grande : 45 cm de long</li> <li>• foliole terminale parfois absente</li> </ul>	
<p><b>Noyer hybride</b> <i>Juglans x intermedia</i></p>  <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 à 17 folioles lancéolées</li> <li>• bord grossièrement denté</li> <li>• taille homogène</li> <li>• face inférieure non pubescente</li> </ul>	
<p><b>Robinier faux-acacia</b> <i>Robinia pseudoacacia</i></p>  <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 à 12 folioles ovales</li> <li>• limbe entier</li> </ul>	 <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 épines à la base de chaque feuille</li> </ul>
<p><b>Sorbier des oiseleurs</b> <i>Sorbus aucuparia</i></p>  <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 à 15 folioles lancéolées</li> <li>• limbe denté</li> </ul>	 <p>© CDAF asbl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fruits en grappe : sorbes</li> </ul>